



دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
فصلنامه‌ی علمی فضای جغرافیایی

سال بیست و دوم، شماره‌ی ۷۷
بهار ۱۴۰۱، صفحات ۸۱-۹۷

DOI:10.52547/GeoSpa.22.1.81

*شمس الله عسگری^۱
حمدیرضا پیروان^۲
صمد شادر^۳
نادر شوهانی^۴

بررسی و شناخت گونه‌های گیاهی سازگار با حفاظت خاک مارن‌های شهرستان ایلام

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۰۵/۰۶

تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

چکیده

مارن‌ها بخش سست سازنده‌ای زمین‌شناسی را تشکیل می‌دهند که بشدت فرسایش پذیر می‌باشند. اقدام پایدار در تثبیت خاک، عملیات بیولوژیکی است. پوشش متراکم گونه‌های مرتعی در برخی مناطق مارنی سبب پایداری خاک در این مناطق شده است. به نظر می‌رسد که برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مارن‌ها در ایجاد چنین پوششی در مناطق تحت پوشش سازنده‌ای مارنی نقش دارند. این تحقیق با هدف بررسی دقیق و سیستماتیک گونه‌های گیاهی و تعیین نیاز رویشگاهی و نیز نقش حفاظتی آنها در سه منطقه شرقی، جنوبی و غربی در شهرستان ایلام به مرحله اجرا درآمد. بدین منظور ^{۳۰} نمونه نهشته مارنی از سه محدوده برداشت شد و بر روی آنها آزمایش‌ها فیزیکی و شیمیایی انجام شد. بررسی‌های گیاه‌شناسی نیز با استفاده از بازدیدهای مکرر صحراوی و پلاتاندازی در ^{۱۸۰} نقطه انجام و نمونه‌های گیاهی پس از انتقال به موزه گیاهی، شناسایی شدند. نتایج نشان داد، با توجه به چینه‌شناسی سازنده‌ای مارنی گوربی، پابده، گچساران و آغازاری، رسوبات این سه منطقه از نظر میزان شوری (EC)، جرم مخصوص ظاهری (BD)، سدیم (Na^+) و درصد اشباع خاک (SP) و برخی پارامترهای فیزیکی از جمله ذرات شن، ماسه و سیلت دارای اختلافات معنی‌داری می‌باشند که R^* تاثیر معنی‌دار خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

^۱- بخش تحقیقات منابع طبیعی و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول). E-mail: Shamsasgari@yahoo.com

^۲- پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران، ایران.

^۳- پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران، ایران.

Email: nadershohni@yahoo.com ^۴- گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

خاک بر نوع پوشش گیاهی را نشان داده است. این تفاوت‌ها می‌تواند به عنوان یکی از عوامل مؤثر در تنوع و اختلاف پوشش گیاهی رویش یافته در سه عرصه باشد. در این تحقیق نیاز رویشگاهی گونه‌های گیاهی سازگار با نوع مارن و نقش حفاظت خاک هر یک از آن‌ها در مناطق شرقی، غربی و جنوبی محدوده شهرستان ایلام معرفی شده است.

کلید واژه‌ها: خصوصیات شیمیایی و فیزیکی، شهرستان ایلام، حفاظت خاک، گونه گیاهی، مارن.

مقدمه


سازندهای مارنی ایران بر حسب میزان و نوع مواد تشکیل‌دهنده آن‌ها دارای اشکال و شدت‌های مختلف فرسایش بوده و بهمین دلیل رسوب زیادی را تولید می‌کنند. از آنجا که استقرار گونه‌های مرتعی بر روی سازندهای مارنی نقش تثبیت مارن‌ها را بر عهده داشته و با توجه به رشد و گسترش متفاوت گونه‌ها بر روی این سازندها، مطالعه ترکیب مارن و شناسایی گونه‌های مرتعی متراکم‌تر و مقاوم‌تر می‌تواند کمک شایانی در ثبات مارن‌ها و پیشگیری از فرسایش مارنی در حوزه‌های آبخیز داشته باشد. بر این اساس و با توجه به گسترش قابل ملاحظه واحدهای مارنی در قلمرو حوزه‌های آبخیز استان ایلام از یکسو و استعداد وقوع انواع ناهنجاری‌های طبیعی از جمله، فرسایش خاک، انواع رخساره‌های فرسایش و رسوب‌زایی بالا از سوی دیگر، شناخت انواع گونه‌های مرتعی که رشد و مقاومت بالایی بر روی سازندهای متفاوت مارنی داشته باشند امری لازم و ضروری است. مارن‌های ایران از نظر دارا بودن کانی‌های قابل انحلال گچ، نمک و انیدریت به دو دسته عمده مارن‌های تبخیری (به سن نئوژن) و مارن‌های غیرتبخیری (قبل از نئوژن) تقسیم‌بندی می‌شوند که هر کدام ویژگی‌های منحصر به فردی دارند (Feizenia et al., 2002). رویکرد چند متغیره از ویژگی‌های خاک بر ویژگی‌های استفاده از زمین (جنگل و مرتع) در آمازون جنوبی برزیل بررسی شد. در این تحقیق ارتباط ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک با مراتع پرورش یافته و جنگل‌های اکالیپتوس با استفاده از رگرسیون چند متغیره بررسی شده است. برای مشخص کردن ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک، نمونه‌برداری شده و رابطه بین ویژگی‌ها با تکنیک‌های چند متغیره تجزیه و تحلیل شده که شامل تجزیه و تحلیل خوش سلسله مراتبی و غیر سلسله مراتبی، تجزیه و تحلیل مولفه اصلی، همبستگی کانونی و مدل‌سازی معادلات ساختاری است. رویکرد چند متغیره برای تجزیه و تحلیل داده نشان داد که ویژگی‌های شیمیایی خاک نسبت به خصوصیات فیزیکی خاک و ویژگی‌های بیولوژیکی خاک نسبت به پوشش جنگلی و مرتعی در تثبیت خاک رابطه معنی‌داری دارد (Marco et al., 2018: 207). در تحقیقی جهت ارتباط تنفس خاک و نوع پوشش گیاهی و ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و روش رگرسیون خطی نمونه‌های خاک از سه استان ایران با الگوهای آب و هوایی نیمه گرم‌سیری و نیمه‌خشک انتخاب شد. در هر نمونه خاک اندازه‌گیری‌های مختلفی از قبیل: بافت خاک، pH، هدایت الکتریکی (EC)، معادل کربنات کلسیم (CCE)، کربن آلی (OC)، نتایج نشان داد که تنفس خاک در زمین‌های کشاورزی نسبت به زمین‌های طبیعی پوشیده شده بالاتر بود اما زمین‌های طبیعی پوشیده از مراتع و جنگل نقش حفاظتی بیشتری نسبت به خاک نشان داد (Ebrahimi

et al., 2018: 137). تعیین گونه‌های گیاهی معرف برخی خصوصیات خاک در مراتع کوه نمک قم با استفاده از تکنیک رسته‌بندی که نتایج نشان داد شوری و بافت خاک، از عوامل اصلی محدودکننده رشد گونه‌های گیاهی این مناطق محسوب می‌شوند و فقط دو گونه *Tamarix aphylla* و *Stipagrostis plumosa* به ترتیب با شنی و شور بودن خاک واکنش مثبت نشان داده‌اند (Tatian et al., 2012: 37). مطالعه بیوژئومورفولوژی سازندهای زمین‌شناسی مارنی با تاکید بر پوشش گیاهی شهرستان لامرد در استان فارس پس از انجام بازدیدهای میدانی خصوصیات مورفومنتری آبراهه‌ها و خصوصیات سطحی دشت توسط آزمون‌های آماری مورد ارزیابی و ارتباط آنها با درصد تاج پوشش گیاهی مورد بررسی گرفت و نتایج حاصل نشان داد که بین تراکم سنگریزه سطحی و تاج پوشش گیاهی در دشت مارنی رابطه مستقیم و معنی‌دار وجود دارد. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که برخی از خصوصیات پلان آبراهه بر تراکم تاج پوشش گیاهی و پراکنش تیپ‌های گیاهی مختلف تاثیرگذار است (Sahati et al., 2016: 26). بررسی نقش پوشش جنگلی در نگهداری خاک به عنوان یک خدمت اکوسیستمی در مقایسه با سایر انواع کاربری اراضی در سطح استان لرستان و شناسایی نواحی با عرضه بالای این خدمت اکوسیستمی انجام شده است (Salarvand et al., 2019: 78). بررسی نقش گونه‌های مرتعی مستقر بر روی سازندهای مارنی در کنترل فرسایش، در شهرستان خوی که در این تحقیق ضمن شناسایی گونه‌ها و تیپ گیاهی و پهنه‌های مارنی در سه منطقه شهرستان خوی، اثرات متقابل عوامل خاکی و پوشش گیاهی نشان داد عامل تراکم پوشش گیاهی با عوامل خاکی اجزای بافتی خاک شامل درصد سیلت و رس در سطح $0/05$ ارتباط داشته و از همدیگر متاثر می‌شوند (Sokouti Oskouie et al., 2019: 127). شناخت گیاهان حفاظتی در سطوح شیبدار سازندهای مارنی مناطق مارنی بازرجان تعریش که در این تحقیق بیش از ۲۰ نوع گیاه شناسایی شده است برخی از آن‌ها گیاهان یک‌ساله که نقش چندانی در کاهش فرسایش ندارند ولی تعداد زیادی از گیاهان چند ساله بوده و با تاج پوشش انبوه و ریشه عمیق با توسعه جانی نقش بسیار مهمی در حفاظت از خاک‌های مارنی ایفا می‌کنند (Agharazi et al., 2019: 76). در تحقیقی به تعداد ۷۲ نمونه خاک و گیاه از مناطق مختلف شهرستان مرند از توابع استان آذربایجان شرقی، اخذ گردید سپس نمونه‌ها به آزمایشگاه منتقل و مقادیر مس، آهن، روی، کلسیم، فسفر، کبات، گوگرد، مولیبدن در نمونه‌های خاک و گیاهان مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند در این مطالعه همبستگی معکوس غیرمعنی‌داری ما بین مقادیر مس خاک و گیاهان و آنتاگونیست‌های رقابتی مس مشاهده شد (Rezaei et al., 2020: 15). نتایج تجربی نشان می‌دهد که در عملیات آبخیزداری برای مارن کرتاسه و ائوسن به راحتی می‌توان بوته کاری انجام داد و تولید رواناب، رسوب و فرسایش را کاهش داد. دیدگاه کلی در این پژوهش این است که بین ترکیب مارن‌ها با امکان استقرار و رشد گونه‌های گیاهی روابط منطقی وجود دارد بنابراین ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی مارن‌ها به عنوان متغیرهای مستقل بر نوع گونه‌های گیاهی استقرار یافته بر مارن‌ها به عنوان متغیر وابسته با استفاده از آزمون‌های آماری و مدل‌های رگرسیونی تجزیه و تحلیل شده است. شناسایی تشکیلات مارنی به طور دقیق و سیستماتیک با گونه‌های

گیاهی و تعیین نیاز رویشگاهی و همچنین نقش حفاظتی آن‌ها طراحی گردید تا نتایج آن جهت کشت این گونه‌ها در مناطق با اقلیم‌ها و زمین‌شناسی مشابه به کار رود.

مواد و روش‌ها

شهرستان ایلام در موقعیت جغرافیایی ۴۵ درجه، ۳۸ دقیقه، ۴۹ ثانیه تا ۴۶ درجه، ۵۱ دقیقه، ۴۱ ثانیه طول شرقی و در ۳۳ درجه، ۲۱ دقیقه، ۲۲ ثانیه تا ۳۳ درجه، ۴۵ دقیقه، ۳۵ ثانیه عرض شمالی با مساحت ۲۱۳۲ کیلومتر مربع، ۱۱٪ مساحت استان ایلام را شامل می‌شود. در این شهرستان، مارن‌های سازند گورپی و پابده از شرق، مرکز تا غرب شهرستان قرار گرفته‌اند و مارن‌های سازند گچساران و آغازاری در جنوب شهرستان قرار گرفته‌اند شکل (۱).



شکل ۱: موقعیت جغرافیایی استان ایلام و شهرستان ایلام

Figure 1: Geographical location of Ilam province and Ilam city

در راستای انجام این پژوهش، مجموعه‌ای از بررسی‌های دفتری، صحرایی و آزمایشگاهی به‌شرح ذیل انجام شده است.

الف- جمع‌آوری آمار و اطلاعات، مطالعات و تحقیقات انجام شده پیشین در سطح منطقه و استان به‌ویژه طرح‌های پژوهشی انجام شده بر روی موضوع مارن.

ب- انجام مطالعات زمین‌شناسی صحرایی به‌منظور تدقیق نقشه‌های موجود و تعیین محدوده‌های گسترش سازندهای مارنی در شهرستان ایلام. بدین منظور پس از تفکیک پهنه‌های مارنی بر روی نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ ایلام در ۵ مرحله بازدیدهای صحرایی صورت پذیرفت و محدوده‌های مارنی بر روی نقشه اصلاح گردید.

ج- شناسایی و تعیین تیپ‌های گیاهی در مناطق مورد مطالعه

- مرحله مقدماتی

در این مرحله اطلاعات، اسناد و مدارک موجود در زمینه پوشش گیاهی و شرایط محیطی و سیمای عمومی منطقه و نقشه‌های مربوطه جمع‌آوری و بررسی گردید. به علاوه نقشه‌های توپوگرافی منطقه به مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ و تصاویر ماهواره‌ای تهیه و محدوده مورد مطالعه بر روی آن‌ها مشخص و مقدمات کارهای میدانی فراهم گردید.

- مرحله انجام مطالعات صحرایی جهت جمع آوری و تکمیل اطلاعات مورد نیاز

ابتدا با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای منطقه، محدوده هر یک از کاربری‌های موجود در منطقه تعیین و مرز هر یک از آنها بر روی نقشه‌های توپوگرافی با مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ مشخص گردید. سپس با در دست داشتن نقشه‌های توپوگرافی با مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ به عنوان نقشه‌های پایه به مناطق مورد مطالعه مراجعه و با گذر از کلیه راه‌های قابل عبور و صعود به ارتفاعات و انجام گشتهای متعدد در محدوده منطقه، با استفاده از دستگاه GPS و دوربین شکاری، محدوده هر یک از کاربری‌ها به صورت دقیق تعیین و بر روی نقشه مشخص گردید. پس از آن با توجه به مختصات به دست آمده و عوارض روی زمین نظیر کوه، دره، رودخانه، جاده و خط الرأس، تیپ‌های گیاهی با روش سیمای ظاهری (فیزیونومی) و فلوریستیکی از هم تفکیک و بر روی نقشه‌ها مشخص گردیدند. نام‌گذاری تیپ‌های مرتبط با توجه به دو تا سه جنس غالب ترکیب گیاهی صورت گرفت.

- شناسایی گونه‌های گیاهی و تهیه لیست فلوریستیک مناطق مورد مطالعه

جهت شناسایی و تهیه لیست گونه‌های گیاهی منطقه ابتدا با استفاده از نقشه‌های توپوگرافی ۱:۵۰۰۰۰ منطقه، محدوده کاربری‌های مختلف با بازدید صحرایی تعیین و روی نقشه متقل گردید. سپس در مناطق معرف هر یک از کاربری‌های مشخص شده، نمونه‌های گیاهی جمع آوری و موقعیت مکان‌های نمونه‌برداری با دستگاه GPS ثبت شد. هم‌زمان با جمع آوری نمونه‌های گیاهی، یاداشت‌های مربوط به وضعیت بوم شناختی و شکل‌زیستی هر یک از گونه‌های گیاهی به صورت مستقیم بر روی زمین انجام گرفت. نمونه‌های جمع آوری شده بر حسب ساختمان و یا طرافیشان در کیسه مخصوص جمع آوری قرار داده شدند. نمونه‌های هرباریومی آماده شده با استفاده از فلور ایرانیکا (Rechinger, 1963-2010)، فلور ترکیه (Davis, 1965-2001)، فلور ایران (Asadi et al., 1988-2010)، فلور رنگی ایران (Mobin, 1980)، گونه‌ای ایران (Masumi, 1989-2008)، رستنی‌های ایران ۱۹۷۸-۲۰۰۶ (Ghahraman, 1996) و فرهنگ نام‌های گیاهان ایران (Mozaffrian, 1996) شناسایی شدند. ضروری است اشاره گردد که اختصار اسامی مؤلفان تاکسون‌ها با سایت IPNI (International Plant Name Index) به آدرس اینترنتی <http://www.ipni.org> تطبیق و یکسان‌سازی شد. شکل‌زیستی گیاهان بر اساس تقسیم‌بندی رانکایر تعیین گردید (Raunkiaer, 1934). در این مدت نمونه‌های جمع آوری شده به ترتیبی نگهداری شدند که خشکیده و یا خراب و پلاسیده نشوند.

- تعیین تراکم گونه‌های گیاهی

تراکم عبارت است از تعداد پایه یک گونه گیاهی در واحد سطح. روش‌های مختلفی جهت اندازه‌گیری تراکم وجود دارد که در این مطالعه از روش اندازه‌گیری مستقیم (شمارش تعداد پایه‌های هر گونه گیاهی در واحد سطح) استفاده گردید. پس از تعیین تیپ‌های گیاهی موجود در منطقه، با توجه به ترکیب پوشش گیاهی و مساحت هر یک از تیپ‌های گیاهی تعداد پلات و اندازه پلات جهت اندازه‌گیری تراکم در هر تیپ گیاهی مشخص گردید. با توجه به

نوع پوشش و گونه‌های غالب موجود در ترکیب پوشش گیاهی منطقه که عموماً گیاهان بوته‌ای و درختچه‌ای هستند از پلات ۲ متر در ۲ متر استفاده گردید. روش نمونه‌گیری تصادفی-سیستماتیک بوده (نقطه اول در هر تیپ با پرتاب یک سنگ به روش تصادفی تعیین و نقاط بعدی با یک فاصله مشخص از نقطه اول مشخص گردیدند) و پس از تعیین محل‌های اسقرار پلات، تعداد هر گونه گیاهی چندساله واقع شده در پلات شمارش گردید. پس از محاسبه تراکم هر گونه در مترمربع، تراکم در هکتار نیز محاسبه گردید.

- ارزیابی و اندازه‌گیری درصد تاج پوشش و فاکتورهای مختلف پوشش گیاهی

به منظور تعیین درصد تاج پوشش هر یک از گونه‌های گیاهی در مناطق مورد مطالعه با استفاده از روش ترانسکت خطی و استقرار پلات‌های دو مترمربعی در مناطق کلیدی و معرف هر تیپ گیاهی به روش تصادفی-سیستماتیک، اقدام به نمونه‌برداری گردید. در این روش درصد ترکیب هر گیاه در داخل پلات‌ها معین و سپس به کل پوشش گیاهی تعیین داده شد. در هر پلات به طور جداگانه ۱۱ فاکتور مورد بررسی قرار گرفت که عبارتند از: درصد تاج پوشش هر گونه گیاهی، درصد خار و خاشاک یا لاشبرگ گیاهی، درصد سنگ و سنگریزه، درصد خاک لخت، درصد حفاظت خاک، درصد گندمیان یکساله، درصد گندمیان چندساله، درصد پهنه برگان یکساله، درصد پهنه برگان چندساله، درصد گیاهان بوته‌ای، درصد گیاهان درختی و درختچه‌ای

- نمونه‌برداری از رسوبات مارنی در محل رویشگاه هر گونه گیاهی از عمق ۲۰ سانتی‌متری و به تعداد ۳ نمونه در هر نقطه. بدین منظور تعداد ۴۸ نمونه از منطقه شهرستان ایلام برداشت گردید.

- با هدف بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مارن‌ها ازمجموع نمونه‌های برداشت شده، تعداد ۳۰ نمونه مارن جهت انجام آزمایشات مربوطه به شرح زیر به آزمایشگاه خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان ارسال گردید.

- آزمایشات فیزیکی: اندازه‌گیری جرم مخصوص ظاهری، اندازه‌گیری جرم مخصوص حقیقی، تعیین بافت خاک با روش پیپت به گونه‌ای که در هر نمونه مارن به لحاظ درصد فراوانی بخش تخریبی و بخش شیمیایی اندازه‌گیری لازم به عمل می‌آید تا نهایتاً میزان درصد گچ، آهک و نمک به عنوان بخش شیمیایی و باقی‌مانده نمونه به عنوان درصد بخش تخریبی در نظر گرفته شد و در نهایت نوع مارن مشخص گردید.

- آزمایشات شیمیایی: ۱- اندازه‌گیری pH در گل اشباع، ۲- اندازه‌گیری EC در عصاره اشباع، ۳- درصد اشباع SP، ۴- اندازه‌گیری مواد آلی با روش سوزاندن تر، ۵- اندازه‌گیری کاتیون سدیم و پتاسیم با دستگاه فلیم فتومنتر، ۶- اندازه‌گیری کاتیون کلسیم و منیزیم به روش تیتراسیون با EDTA و ۷- درصد مواد خنثی شونده (T.N.V.).

- تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشات و تعیین ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی هر رویش گاه در راستای تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشات خاک و پوشش گیاهی و نیز رابطه‌ی این دو، که در نرم‌افزار آماری SPSS طی مراحل زیر انجام شد.


- تعیین ماتریس همبستگی بین کلیه پارامترهای شیمیایی، فیزیکی و پوشش گیاهی.

- مقایسه اثر هر یک از متغیرهای شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی بر نوع پوشش گیاهی مستقر در هر منطقه با استفاده از آزمون آماری.

- بررسی رابطه بین نوع و تیپ غالب پوشش گیاهی به عنوان متغیر وابسته با متغیرهای شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی ذکر شده در بالا به عنوان متغیرهای مستقل و ارائه رابطه رگرسیونی چند متغیره به منظور تعیین نقش پارامترهای مستقل بر استقرار پوشش گیاهی. در نهایت تلفیق نتایج و ارائه روابط موجود بین ویژگی های فیزیکی - شیمیایی مارن ها و نوع پوشش گیاهی همراه با نقش حفاظتی گونه های شناسایی شده.


یافته ها و بحث

تعداد ۳۰ نمونه مارن از مناطق غربی، شرقی و جنوبی شهرستان ایلام با توجه به سازند زمین شناسی جمع آوری شد شکل ۲ که در هر منطقه ۱۰ نمونه با توجه به پراکنش مارن ها و گونه های پوشش گیاهی مورد آزمایش قرار گرفتند که بعد از آنالیز آماری، یافته ها به صورت نمودارهایی در شکل (۳) نشان داده شده است.




شکل ۲: جانمایی نقاط نمونه برداری شده مارن بر سازند های مارنی محدوده شهرستان ایلام

Figure 2: Location of sampled marl points on marl formations in Ilam city



شکل ۳: مقایسه پارامترهای فیزیکو شیمیایی نتایج آزمایش نمونه مارن در مناطق مختلف شهرستان ایلام

Figure 3: Comparison of physicochemical parameters of marl samples in different areas of Ilam city



شکل ۳: مقایسه پارامترهای فیزیکوشیمیابی نتایج آزمایش نمونه مارن در مناطق مختلف شهرستان ایلام

Figure 3: Comparison of physicochemical parameters of marl samples in different areas of Ilam city

نتایج شناسایی پوشش گیاهی منطقه و نقش آنها در تثبیت خاک و جلوگیری از فرسایش خاک

نتایج حاصل از بررسی‌های انجام شده در زمینه پوشش گیاهی نشان داده است که در مناطق مورد مطالعه، تعداد ۳۶ تیره گیاهی با ۹۲ جنس و ۱۲۰ گونه گیاهی وجود دارد. از این تعداد، ۳۹ گونه گیاهی جزء گیاهان یکساله (۱۳ گونه گراس یکساله و ۲۴ گونه پهنه‌برگ علفی یکساله) می‌باشند. گیاهان یکساله موجود در فلور مناطق سه گانه شهرستان ایلام از طرق مختلفی باعث تثبیت مارن و جلوگیری از فرسایش خاک می‌شوند. این گیاهان معمولاً رشد رویشی خود را از اواسط اسفندماه هر سال شروع نموده و در اوایل اردیبهشت‌ماه به گل رفته و نهایتاً در اواسط خردادماه به سیکل زندگی کوتاه مدت خود پایان می‌دهند. در مناطق مورد مطالعه از اوایل اسفند تا اواسط اردیبهشت بیش ترین میزان بارندگی (به صورت باران) صورت می‌گیرد. در این زمان که هنوز گیاهان چندساله‌ی موجود در منطقه، رشد رویشی خود را آغاز نکرده‌اند و یا در ابتدای رشد و جوانمندی می‌باشند، گیاهان یکساله با ظهور به موقع نقش بسیار مهمی در جلوگیری از برخورد مستقیم قطرات باران به خاک ایفا نموده و از این طریق باعث تثبیت مارن‌ها و جلوگیری از فرسایش خاک می‌شوند. این گیاهان در جدول (۱) از لحاظ تثبیت مارن در اولویت رتبه ۳ قرار می‌گیرند. در درجه بعدی بعضی از گیاهان یکساله با تراکم بسیار زیادی که در بعضی از قسمت‌های منطقه دارند باعث تثبیت مارن می‌شوند. وجود ریشه‌های سطحی در گیاهان یکساله و همچنین لاشبرگ‌های باقی مانده از آن‌ها از سال‌های قبل نیز در درجات بعدی نقش مهمی در تثبیت مارن ایفا می‌کنند. از نظر فرم زیستی رانکایر، ۵۵ گونه کریپتوفت در مناطق مورد مطالعه وجود دارد. گیاهان کریپتوفت به دلیل وجود ریزوم و پیاز (غده) در زیر زمین نقش بسیار مهمی در تثبیت مارن‌های منطقه ایفا می‌کنند. این گیاهان با استفاده از ریشه‌های ریزوم و پیاز مانند خود باعث چسبیدن خاکدانه‌ها به هم و پایداری آن‌ها شده و از این طریق باعث تشکیل و استحکام ساختمان خاک می‌شوند. همچنین این گیاهان به دلیل تکثیر جنسی و غیرجنسی و مقاومت بالا در برابر چرای دام (به دلیل قرار گرفتن ریشه آن‌ها در زیر خاک) از تراکم نسبتاً خوبی در منطقه برخوردار بوده و از این طریق نیز در تثبیت مارن و جلوگیری از فرسایش خاک مؤثر هستند. در منطقه مورد مطالعه از نظر فرم زیستی رانکایر، ۲ گونه همی کریپتوفت وجود دارد. گیاهان چندساله‌ی علفی چندساله، ۶۰ گونه گیاهی و از نظر فرم زیستی رانکایر، ۲ گونه همی کریپتوفت وجود دارد. گیاهان چندساله‌ی موجود در مناطق مورد مطالعه از طریق سطح تاج پوشش، ریشه‌های سطحی و عمیق، لاشبرگ و همچنین تراکم بسیار بالا (بعضی از گونه‌های گیاهی) نقش بسیار مهمی در تثبیت مارن و جلوگیری از فرسایش خاک انجام می‌دهند و در جدول (۱) از لحاظ تثبیت مارن در اولویت رتبه ۲ قرار می‌گیرند. همچنین در مناطق مورد مطالعه، ۵ گونه گیاه بوته‌ای و ۱۸ گونه درخت و درختچه وجود دارد. این گیاهان به دلیل سطح تاج پوشش گسترده، ریشه‌های سطحی و بسیار عمیق، تولید لاشبرگ فراوان و تراکم بالا نقش بسیار مهمی در تثبیت مارن و جلوگیری از فرسایش خاک ایفا می‌کنند و از این نظر در جدول (۱) از لحاظ تثبیت مارن در اولویت رتبه اول قرار می‌گیرند. در شکل (۴) تصاویری طبیعی از چند گونه گیاهی سازگار بر مارن‌های منطقه نشان داده شده است.

جدول ۱- لیست گونه‌های گیاهی، شکل زیستی، طول عمر، فرم رویشی و رتبه آنها در ثبیت مارن و جلوگیری از فرسایش خاک در مناطق مورد مطالعه (علام اختصاری شکل زیستی: Ph: فانروفایت، Ch: کاموفیت، He: همی کرپتوفت، Cr: کرپتوفت، Th: تروفیت)

Table 1- List of plant species, biomorphs, longevity, vegetative form and their rank in marl stabilization and prevention of soil erosion in the studied areas (abbreviation of biomorphology: Ph: phanerophyte, Ch: camouflage, He: hemicryptophyte, Cr: cryptophyte, Th: trophite)

| گونه | خانواده | شکل زیستی | طول عمر | فرم رویشی | نوع مارن | رتبه ثبیت |
|-------------------------------------|-----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| <i>Acantholimon bromifolium</i> | plumbaginaceae | ch | چند ساله | بوته | آهکی | ۲ |
| <i>Acer monspessulanum</i> | Aceraceae | ph | چند ساله | درخت | آهکی | ۱ |
| <i>Achillea conferta</i> | Compositae | ch | چند ساله | بوته | آهکی | ۲ |
| <i>Aegilops crassa</i> | Gramineae | Th | یکساله | گندمی | آهکی | ۳ |
| <i>Aegilops cylindricum</i> | Gramineae | Th | یکساله | گندمی | آهکی | ۳ |
| <i>Aegilops umbellulata</i> | Gramineae | TH | یکساله | گندمی | آهکی | ۳ |
| <i>Alcea aucheri</i> | Malvaceae | Cr | چند ساله | پهنه برگ | گچی | ۲ |
| <i>Alhagi cameleurum</i> | Papilionaceae | cr | چند ساله | پهنه برگ | نمکی | ۲ |
| <i>Allium olivieri</i> | Liliaceae | cr | چند ساله | پهنه برگ | نمکی | ۲ |
| <i>Amygdalus arabica</i> | Rosaceae | ph | چند ساله | درختچه | آهکی | ۱ |
| <i>Amygdalus lycioides</i> | Rosaceae | ph | چند ساله | درختچه | آهکی | ۱ |
| <i>Anchusa italic</i> | Boraginaceae | cr | چند ساله | پهنه برگ | گچی | ۲ |
| <i>Ankyropetalum gypsophiloides</i> | Caryophyllaceae | cr | چند ساله | پهنه برگ | گچی | ۲ |
| <i>Anthemise cotulea</i> | Compositae | th | یکساله | پهنه برگ | گچی | ۳ |
| <i>Astragalus curviflorus</i> | Papilionaceae | cr | چند ساله | پهنه برگ | گچی-نمکی | ۲ |
| <i>Astragalus ecbatanus</i> | Papilionaceae | cr | چند ساله | پهنه برگ | گچی | ۲ |
| <i>Astragalus faculifolius</i> | Papilionaceae | cr | چند ساله | پهنه برگ | گچی | ۲ |
| <i>Atriplex leucoclada</i> | chenopodiaceae | cr | چند ساله | پهنه برگ | آهکی | ۲ |
| <i>Avena westii</i> | Gramineae | th | یکساله | گندمی | آهکی | ۳ |
| <i>Boissiera squarrosa</i> | Gramineae | th | یکساله | گندمی | آهکی | ۳ |
| <i>Bromus danthonia</i> | Gramineae | th | یکساله | گندمی | آهکی | ۳ |
| <i>Bromus tectorum</i> | Gramineae | th | یکساله | گندمی | آهکی | ۳ |
| <i>Capparis spinosa</i> | Capparidaceae | cr | چند ساله | پهنه برگ | آهکی | ۲ |
| <i>Capsela bursa pastoris</i> | Cruciferae | th | یکساله | پهنه برگ | آهکی | ۳ |
| <i>Carthamus glaucus</i> | Compositae | th | یکساله | پهنه برگ | گچی | ۳ |
| <i>Carthamus oxyacantha</i> | Compositae | th | یکساله | پهنه برگ | گچی | ۳ |
| <i>Centaurea Intricate</i> | Compositae | cr | چند ساله | پهنه برگ | گچی | ۲ |
| <i>Centurea brugiriana</i> | Compositae | th | یکساله | پهنه برگ | آهکی | ۳ |
| <i>Centurea virgata</i> | Compositae | cr | چند ساله | پهنه برگ | آهکی | ۲ |
| <i>Cerasus macrocarpa</i> | Rosaceae | ph | درختچه | پهنه برگ | آهکی | ۱ |
| <i>Cicorium intybus</i> | Compositae | cr | چند ساله | پهنه برگ | آهکی | ۲ |
| <i>Cleome oxypetala</i> | Capparidaceae | cr | چند ساله | پهنه برگ | نمکی | ۲ |
| <i>Convolvulus oxyphyllus</i> | Convolvulaceae | cr | چند ساله | پهنه برگ | آهکی | ۲ |
| <i>Cornulaca monacantha</i> | chenopodiaceae | ph | چند ساله | درختچه | آهکی | ۱ |
| <i>Cousinia jacobsii</i> | Compositae | cr | چند ساله | پهنه برگ | گچی-نمکی | ۲ |
| <i>Crataegus pontica</i> | Rosaceae | ph | چند ساله | درخت | آهکی | ۱ |

ادامه جدول ۱- لیست گونه‌های گیاهی، شکل زیستی، طول عمر، فرم رویشی و رتبه آن‌ها در تثبیت مارن و جلوگیری از فرسایش خاک در مناطق مورد مطالعه (علامت اختصاری شکل زیستی: Ph: فانروفايت، Ch: کاموفایت، He: همی کرپتوفت، Cr: کرپتوفت، Th: تروفیت)

Continue of Table 1- List of plant species, biomorphs, longevity, vegetative form and their rank in marl stabilization and prevention of soil erosion in the studied areas (abbreviation of biomorphology: Ph: phanerophyte, Ch: camouflage, He: hemicryptophyte, Cr: cryptophyte, Th: trophite)

| گونه | خانواده | شکل | طول عمر | فرم رویشی | نوع مارن | رتبه ثبت |
|---------------------------|-----------------|-----|----------|-----------|------------|----------|
| Cynodon dactylon | Gramineae | cr | چندساله | گندمی | آهکی | ۲ |
| Daphnae mucronatha | Thymelaeaceae | ph | چندساله | درختچه | آهکی | ۲ |
| Ducrosia flabellifolia | Umbelliferae | cr | چندساله | پهن برگ | آهکی | ۲ |
| Echinops ritrodes | Compositae | cr | چندساله | پهن برگ | آهکی | ۲ |
| Ephedra ciliata | Ephedraceae | ph | چندساله | درختچه | آهکی | ۲ |
| Erodium ciconium | Geraniaceae | th | یکساله | پهن برگ | آهکی | ۳ |
| Erodium oxyrrhynchum | Geraniaceae | th | دوساله | پهن برگ | آهکی | ۳ |
| Eryngium billiarderi | Umbelliferae | cr | چندساله | پهن برگ | آهکی | ۲ |
| Euphorbia allepica | Euphorbiaceae | th | یکساله | پهن برگ | آهکی | ۳ |
| Euphorbia macroclada | Euphorbiaceae | cr | چندساله | پهن برگ | آهکی | ۲ |
| Euphorbia macrostegia | Euphorbiaceae | cr | چندساله | پهن برگ | آهکی | ۲ |
| Ferulago macrocarpa | Umbelliferae | cr | چندساله | پهن برگ | آهکی | ۲ |
| Festuca ovina | Gramineae | cr | چندساله | گندمی | آهکی | ۲ |
| Gagea tenuifolia. | Liliaceae | cr | چند ساله | پهن برگ | گچی | ۲ |
| Galium setaceum | Rosaceae | th | یکساله | پهن برگ | گچی - نمکی | ۳ |
| Gundelia tournefortii | Compositae | cr | چندساله | پهن برگ | گچی - نمکی | ۲ |
| Gypsophylla pallida | Caryophyllaceae | cr | چندساله | پهن برگ | آهکی | ۲ |
| Haplophyllum tuberculatum | Rutaceae | cr | چندساله | پهن برگ | آهکی | ۲ |
| Helianthemum salisifolium | Cistaceae | th | یکساله | پهن برگ | آهکی | ۳ |
| Heliotropium ramosissimum | Boraginaceae | cr | چندساله | پهن برگ | آهکی | ۲ |
| Hetheranthelium piliferum | Gramineae | th | یکساله | گندمی | آهکی | ۳ |
| Hordeum bolbosum | Gramineae | cr | چندساله | گندمی | آهکی | ۲ |
| Hordeum marinum | Gramineae | th | یکساله | گندمی | آهکی | ۳ |
| Hymenocarpus cricinatus | Papilionaceae | th | یکساله | پهن برگ | آهکی | ۳ |
| Hypericum scabrum | Hypericaceae | cr | چندساله | پهن برگ | آهکی | ۲ |
| Lolium rigidum | Gramineae | th | یکساله | گندمی | آهکی | ۳ |
| Marrobiuum vulgar | labiate | cr | چندساله | پهن برگ | گچی | ۲ |
| Mathiola longipetala | Cruciferae | th | یکساله | پهن برگ | گچی | ۳ |
| Medicago rigidula | Papilionaceae | th | یکساله | پهن برگ | گچی | ۳ |
| Melica persica | Gramineae | cr | چندساله | گندمی | آهکی | ۲ |
| Muscaria tenuiflorum | Liliaceae | cr | چندساله | پهن برگ | آهکی | ۲ |
| Nerium oleander | Apocynaceae | ph | چندساله | درختچه | آهکی | ۱ |
| Noaea mucronata | chenopodiaceae | ch | چندساله | بوته ای | آهکی | ۱ |
| Oliveria decombeins | Umbelliferae | th | یکساله | پهن برگ | آهکی | ۳ |
| Onobrychis crista alii | Papilionaceae | th | یکساله | پهن برگ | آهکی | ۳ |
| Onobrychis haussknechtii | Papilionaceae | cr | چندساله | پهن برگ | آهکی | ۲ |

ادامه جدول ۱- لیست گونه‌های گیاهی، شکل زیستی، طول عمر، فرم رویشی و رتبه آنها در تثبیت مارن و جلوگیری از فرسایش خاک در مناطق مورد مطالعه (علامت اختصاری شکل زیستی: Ph: فانروفايت، Ch: کاموفیت، He: همی کرپتوفت، Cr: کرپتوفت، Th: تروفیت)

Continue of Table 1- List of plant species, biomorphs, longevity, vegetative form and their rank in marl stabilization and prevention of soil erosion in the studied areas (abbreviation of biomorphology: Ph: phanerophyte, Ch: camouflage, He: hemicryptophyte, Cr: cryptophyte, Th: trophite)

| گونه | خانواده | شکل | طول عمر | فرم رویشی | نوع مارن | رتبه ثبت |
|------------------------|------------------|-----|----------|-----------|------------|----------|
| Onopordon carduchorum | Compositae | cr | دو ساله | پهن برگ | آهکی | ۳ |
| Onosma bulbotrichum | Boraginaceae | cr | دو ساله | پهن برگ | آهکی | ۳ |
| Onosma Orientale | Boraginaceae | cr | چند ساله | پهن برگ | آهکی | ۲ |
| Papaver dubium | Papaveraceae | th | یک ساله | پهن برگ | آهکی | ۳ |
| Phlomis olivieri | labiate | cr | چند ساله | پهن برگ | آهکی | ۲ |
| Phlomise anisodontalis | labiate | cr | چند ساله | پهن برگ | آهکی | ۲ |
| Pistacia atlantica | Anacardiaceae | ph | چند ساله | درخت | آهکی | ۱ |
| Plantago ovate | Plantaginaceae | th | یک ساله | پهن برگ | آهکی | ۳ |
| Plantago psyllium | Plantaginaceae | th | یک ساله | پهن برگ | آهکی | ۳ |
| Poa bulbosa | Gramineae | cr | چند ساله | گندمی | آهکی | ۲ |
| Prangus uloptera | Umbelliferae | cr | چند ساله | پهن برگ | آهکی | ۲ |
| Prosopis farcta | Mimosaceae | ph | چند ساله | درختچه | گچی - نمکی | ۱ |
| Pteropyrum naufelum | Polygonaceae | ph | چند ساله | درخت | آهکی | ۱ |
| Quercus brantii | Fagaceae | cr | چند ساله | پهن برگ | آهکی | ۲ |
| Ranunculus asiaticus | Ranunculaceae | cr | چند ساله | پهن برگ | آهکی | ۲ |
| Reseda aucheri | Resedaceae | ph | چند ساله | درختچه | آهکی | ۱ |
| Rhamnus pallasii | Rhamnaceae | ph | چند ساله | درختچه | آهکی | ۱ |
| Rumex ephedroides | Polygonaceae | ph | چند ساله | درخت | آهکی | ۱ |
| Salix acmophylla | Salicaceae | ph | چند ساله | درختچه | آهکی | ۱ |
| Salsola imbricata | chenopodiaceae | cr | چند ساله | پهن برگ | نمکی | ۲ |
| Salvia bracteata | labiate | cr | چند ساله | پهن برگ | گچی | ۲ |
| Salvia syriaca | labiate | cr | چند ساله | پهن برگ | گچی | ۲ |
| Sanguisorba minor | Rosaceae | ch | چند ساله | بوته ای | آهکی | ۱ |
| Scrophularia striata | Scrophulariaceae | ch | چند ساله | بوته ای | آهکی | ۱ |
| Scrophularia deserti | Scrophulariaceae | cr | دو ساله | پهن برگ | آهکی | ۲ |
| Senecio vernalis | Compositae | th | یک ساله | پهن برگ | گچی | ۳ |
| Silen conoidea | Caryophyllaceae | th | یک ساله | پهن برگ | گچی | ۳ |
| Sinapis aucheri | Cruciferae | cr | چند ساله | گندمی | گچی | ۲ |
| Stipa pennata | Gramineae | th | یک ساله | گندمی | گچی | ۳ |
| Stipa capensis | Gramineae | cr | چند ساله | گندمی | گچی | ۲ |
| Stipa hohenackeriana | Gramineae | th | یک ساله | گندمی | گچی | ۳ |
| Taeniatherum crinitum | Gramineae | cr | چند ساله | پهن برگ | گچی | ۲ |
| Teucrium Oriental | labiate | cr | چند ساله | پهن برگ | گچی | ۲ |
| Teucrium Polium | labiate | th | یک ساله | گندمی | گچی | ۳ |
| Trachynia distachya | Gramineae | th | یک ساله | پهن برگ | گچی | ۳ |
| Traxacum syriacum | Compositae | cr | چند ساله | پهن برگ | گچی | ۲ |

ادامه جدول ۱- لیست گونه‌های گیاهی، شکل زیستی، طول عمر، فرم رویشی و رتبه آنها در تثبیت مارن و جلوگیری از فرسایش خاک در مناطق مورد مطالعه (علامت اختصاری شکل زیستی: Ph: فانروفايت، Ch: کاموفیت، He: همی کرپتوفت، Cr: کرپتوفت، Th: تروفیت)

Continue Table 1- List of plant species, biomorphs, longevity, vegetative form and their rank in marl stabilization and prevention of soil erosion in the studied areas (abbreviation of biomorphology: Ph: phanerophyte, Ch: camouflage, He: hemicyrptophyte, Cr: cryptophyte, Th: trophite)

| گونه | خانواده | شكل | طول عمر | فرم رویشی | نوع مارن | رتبه ثبت |
|------------------------|---------------|-----|----------|-----------|----------|----------|
| Trichodesma elymaitica | Boraginaceae | th | یکساله | پهن برگ | گچی | ۳ |
| Trifolium Resupinatum | Papilionaceae | cr | چندساله | پهن برگ | آهکی | ۲ |
| Trifolium repense | Papilionaceae | th | یکساله | پهن برگ | آهکی | ۳ |
| Trigonella uncinata | Papilionaceae | th | یکساله | پهن برگ | آهکی | ۳ |
| Valerianella vesicaria | valerianaceae | th | یکساله | پهن برگ | آهکی | ۳ |
| vicia sativa | Papilionaceae | ph | چندساله | درختچه | گچی | ۱ |
| Ziziphus numularia | Rhamnaceae | ch | چند ساله | بوته | گچی | ۱ |



شکل ۴: چند نمونه گونه گیاهی سازگار بر مارن های منطقه

Figure 4: Some examples of plant species compatible with regional marls

با توجه به متغیرهای چندگانه موثر بر نوع پوشش گیاهی، داده‌ها در آزمون‌های آماری رگرسیونی تجزیه و تحلیل شد که بهترین آزمون رگرسیون گام به گام بین متغیر پوشش گیاهی و ویژگی‌های خاک، نشان داد که مقدار نیترات سدیم، درصد اشباع خاک، ذرات سیلت و جرم مخصوص ظاهری خاک بیشترین تأثیر را بر نوع پوشش گیاهی در منطقه شرق ایلام دارند این تحلیل در منطقه جنوب ایلام ارتباط جرم مخصوص ظاهری خاک را با نوع پوشش گیاهی معنی‌دار نشان داد و در منطقه غرب شهرستان ایلام درصد سیلت و جرم مخصوص ظاهری خاک با نوع پوشش گیاهی رابطه معنی‌داری در رگرسیون غیرخطی چند متغیره نشان داد که در جداول (۲ تا ۴) نشان داده شده است.

جدول ۲- نتایج آزمون رگرسیون بین متغیر پوشش گیاهی و ویژگی‌های خاک در منطقه شرق ایلام

Table 2- Results of regression test between vegetation variable and soil characteristics in the eastern region of Ilam

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | R Square | Adjusted R Square |
|-------|----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|--------|----------|-------------------|
| | | B | Std. Error | | | | | |
| ۱ | (Constant) | ۲۲۰/۵۳۴ | ۳/۲۷۷ | | ۶/۵۰۵ | .۰/۰۰۰ | | |
| | x _{۱۱} =Na+ | .۰/۸۷۵ | .۰/۱۵۸ | .۰/۸۹۰ | ۵/۵۳۳ | .۰/۰۰۱ | .۰/۷۹۳ | .۰/۷۶۷ |
| ۲ | (Constant) | ۱۵۷/۰۰۹ | ۲۷/۱۵۳ | | ۷/۰۰۳ | .۰/۰۰۱ | | |
| | x _{۱۱} =Na+ | .۰/۹۴۱ | .۰/۱۲۷ | .۰/۹۵۸ | ۷/۴۰۲ | .۰/۰۰۰ | .۰/۷۹۳ | .۰/۷۶۷ |
| | x _V = SP | ۱/۲۷۸ | .۰/۰۲۴ | .۰/۳۱۶ | ۲/۴۴۱ | .۰/۰۴۵ | .۰/۸۸۸ | .۰/۸۵۶ |
| ۳ | (Constant) | ۲۳۲/۶۹۳ | ۳۳/۲۷۶ | | ۷/۹۹۳ | .۰/۰۰۰ | | |
| | x _{۱۱} =Na+ | .۰/۹۱۲ | .۰/۰۹۲ | .۰/۹۲۹ | ۹/۹۲۹ | .۰/۰۰۰ | .۰/۷۹۳ | .۰/۷۶۷ |
| | x _V = SP | ۱/۲۰۲ | .۰/۳۷۷ | .۰/۲۹۷ | ۳/۱۸۸ | .۰/۰۱۹ | .۰/۸۸۸ | .۰/۸۵۶ |
| | x _۵ = B.d | -۴۸/۴۳۵ | ۱۷/۵۸۳ | -.۰/۲۵۲ | -۲/۷۵۰ | .۰/۰۳۳ | .۰/۹۵۱ | .۰/۹۲۶ |
| ۴ | (Constant) | ۱۸۳/۰۵۵ | ۲۵/۶۸۳ | | ۷/۱۲۸ | .۰/۰۰۱ | | |
| | x _{۱۱} =Na+ | ۱/۰۶۲ | .۰/۰۷۳ | .۰/۰۸۱ | ۱۴/۴۹۳ | .۰/۰۰۰ | .۰/۷۹۳ | .۰/۷۶۷ |
| | x _V = SP | ۱/۹۴۴ | .۰/۳۲۷ | .۰/۴۸۱ | ۵/۹۴۷ | .۰/۰۰۲ | .۰/۸۸۸ | .۰/۸۵۶ |
| | x _۵ = B.d | -۶۴/۵۶۶ | ۱۱/۹۸۸ | -.۰/۱۳۶ | -۵/۳۸۶ | .۰/۰۰۳ | .۰/۹۵۱ | .۰/۹۲۶ |
| | x _۱ = E.C | .۶۰/۱۳۱ | ۱۸/۴۹۲ | .۰/۲۹۹ | ۳/۲۵۲ | .۰/۰۲۳ | .۰/۹۸۴ | .۰/۹۷۱ |

a. Dependent Variable: y= نوع پوشش گیاهی

جدول ۳- نتایج آزمون رگرسیون بین متغیر پوشش گیاهی و ویژگی‌های خاک در منطقه جنوب ایلام

Table 3- Results of regression test between vegetation variable and soil characteristics in the southern region of Ilam

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | R Square | Adjusted R Square |
|-------|----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|--------|----------|-------------------|
| | | B | Std. Error | Beta | | | | |
| ۱ | (Constant) | ۱۴۴/۹۶۵ | ۳۱/۰۴۲ | | ۴/۷۷۰ | .۰/۰۰۲ | | |
| | x _۵ = B.d | .۶۱/۳۰۴ | ۲۱/۸۱۲ | .۰/۷۰۵ | ۲/۸۱۰ | .۰/۰۲۳ | .۰/۴۹۷ | .۰/۴۳۴ |

a. Dependent Variable: y= نوع پوشش گیاهی

جدول ۴- نتایج آزمون رگرسیون بین متغیر پوشش گیاهی و ویژگی‌های خاک در منطقه غرب ایلام

Table 4- Results of regression test between vegetation variable and soil characteristics in the western region of Ilam

| Model | | Coefficients ^a | | | | | | |
|-------|------------|-----------------------------|--------|---------------------------|--------|--------|----------|-------------------|
| | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | R Square | Adjusted R Square |
| 1 | (Constant) | ۱۶۱/۷۱۹ | ۸/۶۵۲ | | ۱۸/۶۹۳ | .۰/۰۰۰ | | |
| | x۹= Silt | ۱/۲۴۷ | .۰/۲۲۱ | .۰/۸۹۴ | ۵/۶۴۸ | .۰/۰۰۰ | .۰/۸۰۰ | .۰/۷۷۴ |
| 2 | (Constant) | ۴۰/۰۵۹ | ۳۹/۹۶۲ | | ۱/۰۰۲ | .۰/۳۵۰ | | |
| | x۹= Silt | ۱/۲۷۵ | /۱۵۴ | .۰/۹۱۴ | ۸/۲۷۶ | .۰/۰۰۰ | .۰/۸۰۰ | .۰/۷۷۴ |
| | x۵ = B.d | ۸۳/۳۲۷ | ۲۷/۰۵۷ | .۰/۳۴۰ | ۳/۰۸۰ | .۰/۰۱۸ | .۰/۹۱۵ | .۰/۸۹۱ |

a. Dependent Variable: y= نوع پوشش گیاهی

براساس نتایج آزمایشات شیمیایی و فیزیکی صورت گرفته و همچنین تجزیه و تحلیل‌های آماری، نیاز رویشگاهی تیپ‌های گیاهی مستقر بر روی اراضی مارنی مناطق مختلف شهرستان ایلام تعیین گردید که می‌توان این نتیجه را برای مناطقی از کشور با زمین‌شناسی و اقلیم مشابه تعمیم داده و به عنوان پیشنهاد اجرایی جهت تثبیت بیولوژیکی مارن‌ها ارائه نمود.

نتیجه گیری

در تحقیق حاضر که در سه منطقه شرقی، غربی و جنوبی شهرستان ایلام اجرا شده است ضمن شناسایی گونه‌ها و تیپ گیاهی و پهنه‌های مارنی در سه منطقه و بررسی و تجزیه و تحلیل آماری خصوصیات فیزیکو شیمیایی مارس‌ها و معرفی معنی‌داری این خصوصیات در مناطق سه گانه، نیاز رویشگاهی بر اساس سازند زمین‌شناسی، نوع مارن و نوع اقلیم معرفی شده است و تمامی گونه‌ها و تیپ‌های پوشش گیاهی با توجه به وسعت تاج پوشش گیاهی، ریشه دوانی و یک ساله بودن یا چند ساله بودن، بوته‌ای یا درخت و درختچه‌ای و دیگر ویژگی‌ها، گیاهان سازگار که عملکرد بهتری در حفاظت خاک دارند اولویت بندی شده اند. (Sokouti Oskouie et al (2019: 127) Sokouti Oskouie et al (2019: 127) ضمن شناسایی گونه‌ها و تیپ گیاهی و پهنه‌های مارنی، اثرات متقابل عوامل خاکی و پوشش گیاهی نشان داد عامل تراکم پوشش گیاهی با عوامل خاکی بافتی خاک شامل درصد سیلت و رس در سطح ۵۰٪ ارتباط دارند. این رابطه بین تاج پوشش گیاهی و عوامل خاکی درصد سیلت و رس به اضافه شوری و وزن مخصوص ظاهری خاک تحت تاثیر هم قرار دارند. البته نیاز رویشگاهی مناطق را نیز بر اساس خصوصیات فیزیکو شیمیایی مارن‌ها معرفی نموده‌اند که با نتایج این مقاله قابل مقایسه است. همچنین (Marco et al (2018: 207) Marco et al (2018: 207) بین ویژگی‌های شیمیایی خاک و نوع پوشش گیاهی و تثبیت خاک ارتباط معنی‌داری به دست آورده که با نتایج این مقاله قیاس است. سازگارترین و مهم‌ترین

گونه‌ها در ثبت مارن‌های مناطق به عنوان نتایج ترویجی، کاربردی و اجرایی تحقیق معرفی شده و اولویت اول با گیاهان بوته‌ای و درخت و درختچه‌ای می‌باشد. در مناطق مورد مطالعه ۶ گونه گیاه بوته‌ای با عنوانین *Sanguisorba minor* با نام فارسی کلاه میرحسن، *Achillea conferta* با نام فارسی بومادران انبوه، *Acantholimon* با نام فارسی توت روباهی، *Scrophularia striata* با نام فارسی گل میمونی که در اراضی مارنی آهکی و در مناطق مارنی غربی و شرقی شهرستان ایلام استقرار دارد. *Noaea mucronata* با نام فارسی خارکو و *Ziziphus numularia* با نام فارسی کنارک در اراضی مارنی گچی و تا حدودی نمکی که در منطقه جنوبی شهرستان ایلام استقرار داردند. این گیاهان به دلیل سطح تاج پوشش گسترده، ریشه‌های افshan و بسیار عمیق، تولید لاشبرگ فراوان و تراکم بالا نقش بسیار مهمی در ثبت مارن و جلوگیری از فرسایش خاک ایفا می‌کنند و از این نظر در رتبه اول قرار دارند. این گیاهان در استان ایلام و مناطق دیگر کشور با این ویژگی‌ها جهت حفاظت خاک مارن‌ها توصیه می‌شوند.

References

- AGharzi, H., Mirdavoodi., H., Pirvan, H. R., Davoodirad, A., (2019), "**Recognition of conservation plants in sloping surfaces of marl formations (Case study of Marni areas of Bazarjan Tafresh)**", 7th National Conference on Rainwater catchment system, 20-21, Feb 2019, Tehran. [In Persian].
- Asadi, M., KhatamSaz, M., Mozafarian, V., (2015), "**Iranian Flora**", Agricultural Research, Tehran: Education and Promotion Organization Publication, (23): 92. [In Persian] .
- Davis, P. H., (1988), "**Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vols. 1-10**", Edinburgh University Press: Edinburgh.
- Ebrahimi, M., Sarikhani, R., AkbarSafari, A., (2018), "Estimating the soil respiration under different land uses using artificial neural network and linear regression models", *Catena*, 174: 371-382.
- Feizenia, S., Sharifi, L., Zare, M., (2002), "Formation susceptibility to erosion in the Chaminab Varamin watershed", *Journal of Research and Construction*, 61: 33-38. [In Persian].
- Ghareman, A., (1388), "**Iranian Color Flora**", Tehran: Publications of the Institute of Forests and Rangelands Research. [In Persian].
- Marco, A., Alan, R., Elton Gean, A., (2018), "Multivariate approach of soil attributes on the characterization of land use in the southern Brazilian Amazon", *Soil and Tillage Research*, 184: 207-215.
- Mobin, S., (1375), "**Iranian plants (flora of vascular plants), Volume 4-1**", Tehran: University of Tehran Press. [In Persian].
- Mozaffarian, A., Lee, A., (2009), "**Culture of Names of Iranian Plants**", Tehran: Forests and Rangelands Research Institute Publications. [In Persian].
- Masoumi, A., Mahmoodi, M., A., Hamzai, B., (2009), "Geographical Distribution of Iranian Species", *Journal of Vegetables*, 10 (1): 98-112. [In Persian].
- Raunkiaer, C., (1934), "**The life forms of plants and statistical plant geography**", Clarendon Press: Oxford.
- Rechinger, K. H. (Ed.), (2010), "**Flora Iranica**", Akademische Druck- U Verlagsanstalt Graz, 1-178.
- Rezaei, S., Amir, P., (2020), "Investigation of copper and its antagonists in soil and rangeland plants of Marand region of East Azerbaijan province|", *Geographical Space*, 68: 26-15. [In Persian].
- Sahati, M. T., Noohar, A., Esmailpour, G., H., (2016), "Biogeomorphological study of marl geological formations with emphasis on vegetation) Case study: Al-Mard County, Fars Province", *Two Dry Boom Science*, 6 (2): 26-38. [In Persian].
- Salarvand, J., Ghasemi Aghbash, F., Asadolahi, Z., (2019), "Considering the Role of Forest Cover in Soil Retention as an Ecosystem Services (Case Study: Lorestan Province)", *Geographical Space*, 67: 61-81. [In Persian].
- Sokouti Oskouie, R., Pirvan, H., Broushke, I., Yilaghi, Sh., Ahmadi, A., Abedi, Sh., (2019), "**Investigation of the role of rangeland species based on marl formation in erosion control, case study Khoy)**", Tehran: Institute of Soil Conservation and Watershed Management. [In Persian].